

Trojité superfosfát TSP

HNOJIVO ES

Označení typu: Hnojivo NP
A.2. 2c) Trojitý superfosfát

Fosfor rozpustný v minerálních kyselinách jako P₂O₅

.....46%

Rozpustnost ve vodě.....43%

Čistá hmotnost volně loženo

Výrobce:

ADW AGRO, a.s.

Krahulov 76, 675 21 Okříšky



Rozsah a způsob použití:


Hnojivo se doporučuje používat při aplikaci fosforu k podzimnímu předsetovému hnojení, nebo regeneračnímu hnojení ozimů. Možné použití rovněž k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného dusíkatého přihnojování plodin.

Doporučené dávkování

Kultura	Dávka v kg/ha
Obiloviny	200 - 300
Brambory	200 - 300
Zelí, mrkev, řepa	250 - 350
Rajčata, okurky	200 - 250
Jahody	200 - 250
Plodová zelenina	200 - 250
Travní porosty	150 - 250

Uvedené dávky nevyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů., při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

R 36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži	
S (2)	Uchovávejte mimo dosah dětí	
S 24/25	Zamezte styku s kůží a očima	
S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc	
S 36/37/39	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít	
S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení	

Podmínky skladování:

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 metry, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balený se skladuje

Ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 metru nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí .

První pomoc:

Při nadýchání: okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv), zajistěte postiženého proti prochlazení, zajistěte lékařské ošetření.

Při styku s kůží: odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody, pokud nedošlo k poškození (poranění) pokožky je možné použít i mýdlo, zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí: ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím), popř. vyjměte kontaktní čočky, výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte lékařské ošetření.

Při požití: nevyvolávejte zvracení! Pokud možno podejte medicínální uhlí, zajistěte lékařské ošetření.

Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2; tel.: nepřetržitě 224919293 a přes centrálu 224914571-4

Doba použitelnosti:

18 měsíců při dodržení podmínek skladování.

Datum výroby:

VI /2018